



DAWKOWANIE HYDROKORTYZONU W PRZYPADKU OPERACJI, ZABIEGÓW STOMATOLOGICZNYCH, PORODU ORAZ ZABIEGÓW INWAZYJNYCH osoby dorosłe

Wysiętek fizyczny	Dodatkową dawkę należy ustalić z lekarzem na podstawie obrazu klinicznego i kondycji pacjenta.
Silny stres emocjonalny	Jednorazowo dodatkowe 5-15 mg.
Infekcja z gorączką lub uraz	Zwiększenie dawki dobowej dwu- lub trzykrotnie do czasu poprawy stanu ogólnego.
ZABIEG OPERACYJNY WIĄŻĄCY SIĘ Z PRZEDŁUŻONĄ REKONWALESCENCJĄ (np. laparotomia)	
	100 mg i.v. przed znieczuleniem → 50 mg i.v. co 6h przez najbliższe 48h lub dłużej, do czasu rozpoczęcia samodzielnego przyjmowania płynów i pokarmów → podwójna dawka GKS → zmniejszanie do dawki dobowej.
MNIEJSZY ZABIEG OPERACYJNY ZE SKRÓCONĄ REKONWALESCENCJĄ (np. laparoscopia)	
	100 mg i.v. przed znieczuleniem → 50 mg i.v. co 6h przez 24h do 48h → podwójna dawka GKS doustnych przez 24-48h → zmniejszanie do dawki dobowej.
PORÓD SIŁAMI NATURY (cc rozważamy jako zabiegi operacyjne)	
	100 mg i.v. w momencie rozpoczęcia akcji porodowej, w razie konieczności kolejne dawki 50 mg co 6h (przedłużająca się akcja porodowa) → podwójna dawka dobową doustną GKS przez 24-48h → zmniejszanie do dawki dobowej.
ZABIEGI OPERACYJNE MNIEJSZE LUB WIĘKSZE ZABIEGI STOMATOLOGICZNE BĄDŹ CHIRURGII SZCZĘKOWEJ	
	100 mg i.v. tuż przed znieczuleniem → podwójna dawka doustną GKS przez 24h → powrót do dawki dobowej.
ZABIEGI ENDOSKOPOWE WYMAGAJĄCE ŚRODKÓW PRZECZYSZCZAJĄCYCH	
	24h wcześniej przed planowanym zabiegiem: 100 mg i.v. oraz płyny i.v. → 100 mg i.v. przed rozpoczęciem endoskopii → podwójna dawka doustną GKS przez 24h → powrót do normalnej dawki dobowej.
PROCEDURY INWAZYJNE (np. szycie rany)	
	50 mg i.v. przed zabiegiem → podwójna dawka doustną GKS przez 24h → powrót do normalnej dawki dobowej.
ZABIEGI STOMATOLOGICZNE	
	Dodatkowa poranna dawka doustną GKS godzinę przed zabiegiem → podwojenie dawek doustnych GKS przez 24h → powrót do normalnej dawki.
MAŁE ZABIEGI (np. zdjęcie szwów, zmiana opatrunku)	
	Ostona steroidowa nie jest konieczna → jeśli pacjent prezentuje objawy - dodatkowa pojedyncza dawka np. 20 mg.

